


蚊に刺されたくないために



屋外でヒトスジシマカに刺されないために

対策1

肌の露出を控える

蚊の多い場所に行くときは、長袖、長ズボンを着用しましょう。



提供写真: 国立感染症研究所

ヒトスジシマカは
デング熱など*の
原因となる蚊です。

* チクングニア熱、
ジカウイルス感染症など

ヒトスジシマカの特徴1

おもに
日中屋外で
活動する

対策2

虫よけ剤を使用

(成分名:ディートやイカリジン等)
肌などに塗るかスプレーします。
小児に使用する場合は取り扱いに
注意しましょう。



対策3

定期的な雑草の
刈り取り・樹木の
せん定



ヒトスジシマカの特徴2

活動範囲は
100~150m
程度と狭い

ヒトスジシマカの特徴3

やぶ・木陰
などにいて人を
待ち伏せする

湿った風通しの
悪い場所は絶好の
潜み場所

蚊を増やさない対策 発生源となる小さな水たまりをなくしましょう。



鉢の受皿



古タイヤ



空き缶・空きびん



雨ざらしの用具



防水シートの水たまり

- 蚊は10~17日で卵から成虫になります。1週間に1度、水たまりをなくすことで、蚊の抑制に大きな効果があります。
- 蚊に対する殺虫剤散布は、一時的な効果しかありません。殺虫剤は補助的に使用しましょう。

相談窓口

世田谷保健所 生活保健課 生活環境衛生
TEL: 03-5432-2903 FAX: 03-5432-3054

